

Gestație falsă (pseudograviditate), lactație falsă


În medicina veterinară, întreruperea unei gestații sau lactații false (care se declanșează fără actul fătării) se tratează cu produse hormonale (care acționează asupra prolactinei, aceasta din urmă fiind denumită și hormonul gestației).

De asemenea, se recomandă o dietă săracă în lichide, diferite calmante pentru comportamente anormale sau manifestări nervoase, diferite comprese, antiinflamatoare și medicamente antialgice pentru tumefierea mamelelor și pentru durerea percepută din această cauză. Se întâmplă de multe ori ca animalul să își lingă și să își sugă propriile mameloane și mamele, caz în care se recomandă aplicarea și purtarea gulerului elisabetan.

Tratamentul homeopat este mult mai ușor de aplicat, atât pentru proprietar, cât și pentru animal, este mai sănătos și totodată oferă un rezultat mult mai eficient.

După câteva zile de administrare, terapia homeopată suprimă atât fizic, cât și psihic gestația și lactația falsă, fără intervenția terapeutului cu substanțe chimice sau prin metode care să oblige animalul la diferite intervenții forțate.

În urma tratamentului homeopat intervine vindecarea reală datorită faptului că organismul este ajutat să își regleze singur fenomenele fiziologice, prin urmare simptomatologia dispare. Dacă animalele sunt tratate prin terapie homeopată, posibilitatea recidivării acestor probleme este mult mai redusă în comparație cu medicația clasică.



Tücsök - cățelușă din rasa Puli, în vârstă de 6 ani

Stăpânul cățelușei ne-a relatat următoarele simptome existente: comportament anormal, de câteva zile își construise un cuib, în care își aduna diverse obiecte, mai apoi i s-a declanșat lactația și își lingea și suga mameloanele. Mamelele erau tumefiate, dar încă nu erau inflamate.



Mamele tumefiate



Lapte

Am recomandat un tratament homeopat, stăpânul cățelușei administrând animalului remediul sub formă de soluție orală. După doar trei zile de administrare, cățelușă nu și-a mai supt mameloanele, doar foarte rar lingându-și mamele. Mamelele au devenit mai reduse în volum, însă secreția de lapte încă nu s-a oprit în totalitate în acel moment. După încă trei zile de administrare (în total șase zile), abia se mai putea evidenția o secreție asemănătoare zerului prin mulgerea mameloanelor cățelușei. După administrarea produsului în aceste câteva zile, comportamentul cățelușei și-a revenit la normal, nu a mai fost nevoie de alt tratament.

Dr. Jakab Ferenc
medic veterinar homeopat
www.homeopatieveterinara.ro